

grünblau sein, mit vollkommen ovalen Flügeldecken und lebt in der Ebene (Lenkoran); es kann also nicht in Betracht kommen.

Herrn Zolotarew danke ich für die Überlassung dreier Stücke für meine Sammlung.

Bei dieser Gelegenheit sei auch meine Ansicht über *B. Zolotarewi* Rtrr. (Wiener Ent. Zeit. 1910, XXIX., 313) ausgesprochen. Beide von mir untersuchten Typen gehören nach der Skulptur des Kopfes und des Halsschildes in die Nähe des *B. decorum-siculum* und nicht in das Subgenus *Pseudolimnaeum*.

## Über die mir bekannten Varietäten von *Phytodecta (Spartophila) pallida* Lin.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Einfarbig gelbrot: *Spartophila pallida* Lin.: Stammform. — Unterseite schwarz:

1. Oberseite gelbrot, ein verkürztes Querband auf der hinteren Hälfte des Halsschildes oder zwei größere Flecken schwarz. — Lappland. a. **nigrobasalis** n.
2. Oberseite gelbrot, ein großer gemeinschaftlicher Fleck hinter der Basis der Flügeldecken schwarz. — Lappland. a. **fuscidorsis** n.
3. Oberseite gelbrot, einige Makeln auf den Flügeldecken schwarz. a. **decipiens** Wse.
4. Oberseite gelbrot, zwei Makeln am Halsschild und mehrere zusammengeflossene auf den Flügeldecken schwarz. a. **borealis** Oliv.
5. Oberseite gelbrot, Flügeldecken schwarz. — Styria. a. **nigripennis** Wse.
6. Oberseite gelbrot, Halsschild und Schildchen schwarz. — Lappland. a. **nigrithorax** n.
7. Oberseite schwarz, der Kopf rostrot, die Flügeldecken an der Spitze im weiten Umfange rostgelb. — Lappland. a. **erythrura** n.
8. Oberseite schwarz, der Kopf, die Basis der Fühler und die Beine ganz oder teilweise gelbrot. — Lapponia. a. **frontalis** Oliv.
9. Körper ganz schwarz, nur die Fühlerbasis und der Mund rot. — Tatra. a. **nigricolor** n.